



Filière Grande Culture CULTURE CANNE-A-SUCRE

N°02 - Données de janvier à février 2021

Région GUADELOUPE




Charbon/Chenille défoliatrice :
Aucune présence de ces nuisibles n'a été observée sur les parcelles du réseau.

Enherbement :
A quelques semaines de la récolte sucrière, la gestion de l'enherbement n'est pas forcément nécessaire.

Localisation des parcelles « canne à sucre »

Parcelles de canne à sucre (15)



On observe la parcelle :
Méthodologie en dernière page

Situation globale des organismes observés

Organismes suivis	Niveau de présence
Enherbement	
Rouille orangée « <i>Puccinia kuehnii</i> »	
Charbon « <i>Sporisorium scitamineum</i> »	
Chenilles défoliatrices	

Niveau de présence: ■ Absence Faible Moyen Fort

Toutes les éditions sur : <https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal>

L'ensemble des informations de ce BSV ne concerne que les données issues des parcelles d'observations. Il est nécessaire et important d'observer sa parcelle avant toute intervention.

Responsables de la rédaction
Lucie AMAND
amand.fredon971@orange.fr
Franck VILLAGEOIS
Tél : 0590 25 17 17



Comité de relecture
CTCS - F. GROSSARD
INRAE - S. GUYADER
DAAF/SPAVE - P. HUGUENIN et C. DIMAN
DAAF/SPAVE - L. PILLET
CIRAD - JH. DAUGROIS et Y. CHILIN-CHARLES

FREDON Guadeloupe
C/o CIRAD - Station de Neufchâteau
Sainte-Marie
97130 Capesterre-Belle-Eau
Tél : 0590 41 68 45

FILIÈRE GRANDE CULTURE - Culture canne à sucre

Résultats des suivis des parcelles d'observation

Enherbement




FILIÈRE GRANDE CULTURE - Culture canne à sucre

Quelques outils pour mieux gérer sa parcelle

Observations personnelles à réaliser dans sa parcelle

Organe à observer	Symptômes	Nuisible possible
<u>Observer la parcelle entière</u> Tige	Au bout des tiges, apparition d'un « fouet charbonneux » noir ou excroissance	Charbon
Feuille	Les jeunes pousses découpées, dévorées	Chenille
Au pied de la canne	Plantes rampantes, grimpantes	Enherbement

Planche photos pour identification des organismes



Moyens de lutte / Méthodes prophylactiques

L'utilisation de variétés résistantes permet de lutter contre certaines maladies, telles que le charbon de la canne à sucre.

Pour l'enherbement, il est important de bien désherber sa parcelle au cours des trois premiers mois après la coupe ou la plantation. La présence des adventices sur les parcelles de canne à sucre entre en concurrence avec la culture pour l'eau, les éléments nutritifs du sol et la lumière, impactant ainsi le rendement.

Organisme réglementé : Rouille orangée *Puccinia kuehnii*

Aucune présence officielle n'a été déclarée sur le territoire, en cas de soupçons, contactez :
Service de l'Alimentation de la DAAF (0590.99.60.50) ou FREDON (0590.41.68.42)



Ne pas confondre



La rouille orangée
(statut : non présent sur le territoire)



La rouille brune
(statut : présent en Guadeloupe)

Crédits photos : JH DAUGROIS (CIRAD)

Tout document utilisant les données contenues dans ce BSV doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du BSV.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Française de la Biodiversité (OFB), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner, envoyer un mail : amand.fredon971@orange.fr

